

ส่วนที่ ๓ : แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อ
เสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการฝากครรภ์เร็วไว แม่ลูกปลอดภัย

๑. ผลการดำเนินงาน

๑.๑.จัดประชุม อสมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

๑.๒.จัดอบรมหญิงตั้งครรภ์และสามี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุยิ ตำบลลาโละ

อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน ๙๖คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑.๓.ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุยิ ตำบล
ลาโละ อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุข ผดุงครรภ์โบราณ หญิงตั้งครรภ์และสามี
จำนวน ๙๖คน ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ร้อยละ ๘๐

๑.๔.อสม.สำรวจหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้มาฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ ๑๒
สัปดาห์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุยิ ตำบลลาโละ อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

๑.๕.ได้แจกของขวัญให้กับหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ ๑๒สัปดาห์ ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุยิ ตำบลลาโละ อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

๑.๖.อสม.ได้ติดตามเกี่ยวกับการรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กและไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ

๑.๗.จัดระบบการติดตามทารกที่กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย๖เดือน

๒. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ๑๒,๐๐๐.....บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง๑๒,๐๐๐.....บาท คิดเป็นร้อยละ๑๐๐

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ๐.....บาท คิดเป็นร้อยละ ๐

๔. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี

มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)

๑.หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ก็ได้รับการดูแลระหว่างตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีที่มาฝากครรภ์เกินอายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์เพราะส่วนใหญ่หญิงตั้งครรภ์ไม่ค่อยตระหนักถึงเรื่องสุขภาพ

๒.หญิงตั้งครรภ์บางส่วนก็ทำงานอยู่ที่มาเลเซีย ทำให้มาฝากครรภ์ตอนอายุครรภ์มากแล้วและทำให้ฝากครรภ์ไม่ครบ๕ครั้งตามเกณฑ์

๓.ยังพบหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเนื่องจากหญิงตั้งครรภ์ไม่ยอมรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง บางรายก็ทานยาวันเว้นวัน เพราะถ้าทานยาแล้วจะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย เวียนศีรษะ ไม่มีแรง ต้องนอนอยู่กับบ้านทำให้ไม่สามารถที่จะออกไปทำงานได้ จึงไม่ค่อยได้ทานยาเป็นประจำ และบางรายก็บอกว่าเวลาทานยาแล้วไม่กล้าที่จะรับประทานอาหารบางอย่างเพราะกลัวว่าอาหารกับยานั้นจะตีกันเช่นมัน ทูเรียน มะละกอ เป็นต้น จึงไม่ค่อยรับประทานยาและทานยาไม่สม่ำเสมอ

แนวทางการแก้ไข (ระบุ)

๑.สร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีให้กับหญิงตั้งครรภ์ในการดูแลตัวเอง

๒.สร้างความตระหนักถึงการรับประทานยาสม่ำเสมอร่วมกับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นตับ ไข่แดง ผักใบสีเขียวเข้มๆ เป็นต้นเพื่อป้องกันภาวะซีด และควรจะมีการจัดระบบการติดตามการรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กและไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์โดยมีสามีหรือบุตรเป็นผู้ควบคุมดูแล

๓.ให้อบรมติดตามค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่โดยให้ส่งรายงานให้กับเจ้าหน้าที่ทุกเดือน

ลงชื่อ อาสา

ผู้รายงาน

(.....นางสาวฉวีภา ธิษะณี.....)

ตำแหน่งสหภาพภควิภา ธิษะณี.....

วันที่-เดือน-พ.ศ. 20 ธันวาคม 2560