

การป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่ได้ผลและมี ประสิทธิภาพนั้น จำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุก ๆ ฝ่าย ทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน โรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนในพื้นที่ ร่วมบูรณาการกันป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังโรคตลอดเวลา เช่นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ไม่ให้มีลูกน้ำยุง สุ่มสำรวจความชุกลูกน้ำยุง ใส่ทรายฆ่าลูกน้ำยุง รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการป้องกันและควบคุมโรค และเมื่อเกิดโรคขึ้นสามารถควบคุมการแพร่กระจายของโรคได้อย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้มีการระบาดของโรคเกิดขึ้น

วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)

การดำเนินงานเฝ้าระวังโรค

๑. จัดทำโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

๒. ประชุมชี้แจงโครงการแก่อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน

๓. ประชาสัมพันธ์โครงการโดยอสม.ตามเขตรับผิดชอบ

๔. ดำเนินกิจกรรมโครงการ

- สำรวจลูกน้ำบริเวณบ้านโดยอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตรับผิดชอบร่วมกับเจ้าของบ้าน

อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง/หมู่

- ประชาสัมพันธ์การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ ๑ และ ๒ ของทุกเดือน

- จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันโรคในชุมชน ได้แก่ การสาธิตการคัดแยกขยะ ในชุมชน การให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะ

พ่นหมอกควัน และพ่นสเปรย์กำจัดยุง ทรายอะเบทให้แก่ครัวเรือนที่มีผู้ป่วยและครัวเรือนใกล้เคียงเพื่อควบคุมโรคเบื้องต้น

- จัดกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง คัดแยกและกำจัดขยะ ตามเขตรับผิดชอบของ อสม.แต่ละคน ๒ เดือน/

ครั้ง

๕. สรุปผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานขณะระบาด

๑. ใช้สารเคมีทำลายตัวแก่ลูกน้ำ (ทรายที่มีฟอส) และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงใน บ้านและบริเวณหลังคาเรือนทุกหลังในละแวกที่มีการระบาดของโรค

๒. พ่นยากันยุงและสนับสนุนโลชั่นกันยุง พ่นหมอกควันแก่หลังคาเรือนที่มีผู้ป่วยและหลังคาเรือนใกล้เคียงในระยะ ๑๐๐ เมตร

๓. สอบสวนโรคและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค

๔. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน องค์กรในชุมชน ในการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๒. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ลดลง

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์โดยตรง

ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางขุนทอง ทุกหมู่บ้าน/ทุกชุมชน

๑. อัตราป่วยด้วยกลุ่มโรคไข้เลือดออกไม่เกิน ๕๐ ต่อประชากรแสนคน

๒. มีกิจกรรมสำรวจลูกน้ำทุกบ้านอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง/หมู่