

แนวทางแก้ไข (ระบุ)

- 1.อาศัยการโทรศัพท์พูดคุยกับคนไข้หรือ DOTS ผ่านทางไลน์
- 2.เยี่ยมบ้านทุกวันและพูดคุยกับคนไข้เพื่อให้คนไข้เกิดความเข้าใจและเกิดความไว้วางใจที่จะ

ยินยอมให้ทำการ DOT

- 3.ให้กำลังใจกับคนไข้ที่ไม่อยากรับประทานยาหรือเกิดอาการท้อในการรักษา โดยโทรศัพท์คุยกับคนทุกวันจนคนไข้รู้สึกว่ามีเจ้าหน้าที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือในการรักษาเพื่อให้รักษาหายขาด
- 4.ติดตามกับกับการรับประทานยาของคนไข้ที่ขยายการรักษาอย่างต่อเนื่อง
- 5.ปกปิดข้อมูลคนไข้ให้เป็นความลับ
- 6.คนไข้ที่ทานยาทุกวันแต่เสมหะยังพบเชื้อต้องทำการ DOT อย่างเข้มข้นทุกวัน

ลงชื่อ นางสาวสุภา ผู้รายงาน

(นางสาวมาวีญา ยูโชะ)

นักวิชาการสาธารณสุข